

**Corso di Laurea in Informatica**  
**I parziale di Analisi Matematica**  
**17 Dicembre 2018**  
**Marco Mughetti**

Cognome: .....

Nome: .....

Numero di matricola: .....

Email: .....

Risultati

1.(pt.1)	
2.(pt.1)	
3.(pt.2)	
4.(pt.6)	
5.(pt.5)	

Risolvere gli esercizi seguenti, scrivendo e motivando dettagliatamente il procedimento seguito. Soluzioni prive di calcoli e spiegazioni **NON SARANNO VALUTATE**.

È possibile scrivere sul retro dei fogli se lo spazio previsto per la risposta non è sufficiente.

**Esercizio 1**(pt. 1)

Data  $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ , scrivere la definizione di

$$\lim_{x \rightarrow -3^+} f(x) = -\infty$$

*Risposta:*

$$\forall M > 0: \exists \delta = \delta(-3, M) > 0: \forall x \in \mathbf{R}: -3 < x < -3 + \delta \\ \Rightarrow f(x) < -M$$

**Esercizio 2**(pt. 1)

Stabilire se la seguente affermazione sia corretta:

“Dato  $\emptyset \neq A \subset \mathbf{R}$  e data  $f : A \rightarrow \mathbf{R}$  derivabile su  $A$ , se la sua derivata prima  $f'$  è identicamente nulla su  $A$  (cioè,  $f'(x) = 0, \forall x \in A$ ) allora  $f$  è costante su  $A$ .”

Giustificare la risposta.

*Risposta:*

L' affermazione è vera se  $A$  è un intervallo.

$$A = [a, b], \forall x_1, x_2 \in [a, b]: x_1 < x_2$$

Del T. di Lagrange:  $\exists c \in ]x_1, x_2[$ :

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c) = 0 \Rightarrow f(x_2) = f(x_1)$$


Se  $A$  non è un intervallo:

$$f(x) = \arctan x + \arctan \frac{1}{x}$$

$$A = \mathbf{R} \setminus \{0\}$$

$$f(x) = \frac{\pi}{2} \text{ se } x > 0 \quad f(x) = -\frac{\pi}{2} \text{ se } x < 0$$





**Esercizio 4**(pt. 6)

Sia data la funzione  $\mathcal{D}(f) \rightarrow \mathbf{R}$

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x - 4}{x + 2} e^x.$$

I Disegnare il suo grafico.

II Calcolare l'immagine di  $f$  sul suo dominio naturale  $\mathcal{D}(f)$ .

III Stabilire per quali  $\lambda \in \mathbf{R}$  l'equazione  $f(x) = \lambda$  ha due soluzioni reali distinte.

Può essere utile ricordarsi che  $2 < e < 3$ .

$$\mathcal{D}(f) = \mathbf{R} \setminus \{-2\}$$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(x^2 + 2x - 4)e^x}{x + 2} = 0$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 2x - 4}{x + 2} \cdot e^x = +\infty$

$\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = \begin{cases} +\infty \\ -\infty \end{cases}$


$= \lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{1}{x + 2} \cdot (x^2 + 2x - 4)e^x$

$\begin{matrix} +\infty & \swarrow & \searrow & \downarrow \\ x \rightarrow -2^+ & & x \rightarrow -2^- & -4e^{-2} \end{matrix}$

$$f'(x) = \frac{(2x+2)e^x(x+2) + (x^2+2x-4)e^x(x+2) - (x^2+2x-4)e^x}{(x+2)^2}$$

$$= \frac{e^x}{(x+2)^2} \cdot [2(x+2) \cdot (x+2) + (x^2+2x-4) \cdot (x+2)]$$

$$= \frac{e^x}{(x+2)^2} (x+2) (2x+4 + x^2+2x-4) = \frac{e^x}{(x+2)^2} \cdot (x+2)(x^2+4x)$$



$$f(-4) = -\frac{2}{e^4} \quad f(-1) = -\frac{5}{e} \quad -\frac{2}{e^4} > -\frac{5}{e} \quad (\Leftrightarrow e^3 > \frac{2}{5})$$

$$f(0) = -2$$

**Esercizio 5**(pt. 5)Sapendo che, per  $t \rightarrow 0$ ,

- $\sin t = t - \frac{1}{3!}t^3 + \frac{1}{5!}t^5 - \frac{1}{7!}t^7 + o(t^7)$ ,
- $e^t = 1 + t + \frac{1}{2!}t^2 + \frac{1}{3!}t^3 + \frac{1}{4!}t^4 + \frac{1}{5!}t^5 + \frac{1}{6!}t^6 + o(t^6)$ ,
- $\cos t = 1 - \frac{1}{2!}t^2 + \frac{1}{4!}t^4 - \frac{1}{6!}t^6 + o(t^6)$ ,
- $\ln(1+t) = t - \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{3}t^3 - \frac{1}{4}t^4 + \frac{1}{5}t^5 - \frac{1}{6}t^6 + o(t^6)$ ,

calcolare

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x \cos(x)} - \ln(1 + xe^x) + \frac{1}{6} \sin(x^3) - 1}{x^4}$$

*Risposta:*

CALCOLARE gli sviluppi di Taylor delle seguenti funzioni, NELLA FORMA in cui saranno usati nel limite dato (con tutte le semplificazioni algebriche effettuate) e risolvere il limite assegnato:

$$\bullet \frac{1}{6} \sin(x^3) = \frac{1}{6} \left( x^3 + o\left((x^3)^2\right) \right) = \frac{x^3}{6} + o(x^4)$$

$$\begin{aligned} \bullet e^{x \cos(x)} &= 1 + x \cos x + \frac{(x \cos x)^2}{2!} + \frac{(x \cos x)^3}{3!} + \frac{(x \cos x)^4}{4!} + o\left(\overset{o(x^4)}{(x \cos x)^4}\right) \\ &= 1 + x \left( 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right) + \frac{\left( x - \frac{x^3}{2} + o(x^4) \right)^2}{2} + \frac{\left( x - \frac{x^3}{2} + o(x^4) \right)^3}{6} \\ &\quad + \frac{x^4}{4!} + o(x^4) = \\ &= 1 + \left( x - \frac{x^3}{2} \right) + \frac{1}{2} \left( x^2 - x^4 \right) + \frac{1}{6} x^3 + \frac{x^4}{24} + o(x^4) \\ &= 1 + x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + \left( -\frac{1}{2} + \frac{1}{24} \right) x^4 + o(x^4) \\ &= 1 + x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{11}{24} x^4 + o(x^4) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\bullet \ln(1 + xe^x) &= x e^x - \frac{(x e^x)^2}{2} + \frac{(x e^x)^3}{3} - \frac{(x e^x)^4}{4} + o\left(\frac{(x e^x)^4}{11}\right) \\
&= x \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + o(x^3)\right) - \frac{(x + x^2 + \frac{x^3}{2} + o(x^3))^2}{2} \\
&\quad + \frac{(x + x^2 + o(x^2))^3}{3} - \frac{x^4}{4} + o(x^4) \\
&= \left(x + x^2 + \frac{x^3}{2} + \frac{x^4}{6}\right) - \frac{x^2}{2} - x^3 - \frac{x^4}{2} - \frac{x^4}{2} \\
&\quad + \frac{x^3}{3} + x^4 - \frac{x^4}{4} + o(x^4) = \\
&= x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} - \frac{x^4}{12} + o(x^4)
\end{aligned}$$

Quindi:

$$\begin{aligned}
e^{x \cos(x)} - \ln(1 + xe^x) + \frac{1}{6} \sin(x^3) - 1 &= \cancel{1} + \cancel{x} + \frac{\cancel{x^2}}{2} - \cancel{\frac{x^3}{3}} - \frac{11}{24} x^4 - \\
- \cancel{x} - \frac{\cancel{x^2}}{2} + \frac{\cancel{x^3}}{6} + \frac{x^4}{12} + \frac{\cancel{x^3}}{6} - \cancel{1} + o(x^4) &= \\
= -\frac{9}{24} x^4 + o(x^4) &
\end{aligned}$$

e infine

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x \cos(x)} - \ln(1 + xe^x) + \frac{1}{6} \sin(x^3) - 1}{x^4} = -\frac{3}{8}$$